



Les milieux forestiers

Les milieux forestiers sont **très présents sur le territoire** de la Communauté de Communes. La majorité des forêts est composée par des **chênes** (sessile et pédonculé) avec 22 489 ha, les forêts de **résineux** ne couvrent que 2 792 ha.

La forêt domaniale des Bertranges fait partie intégrante du territoire de la Communauté de communes. D'une superficie de 7 672 ha, c'est la deuxième forêt productrice de chênes en France. Elle abrite **une faune et une flore remarquables**. La Cigogne noire est présente sur l'ensemble du massif forestier. La première nidification a été constatée en 2003, ce qui en fait le **foyer historique de découverte de la Cigogne noire** au niveau départemental.

Plusieurs chênes remarquables sont présents sur différentes communes du territoire comme à Raveau où se trouvent le Chêne du Ginardeau et le Chêne du Garde âgés d'environ 300 ans.

La présence d'un **réseau dense** de grands ensembles forestiers est un trait marquant du territoire et permet un **lien paysager et fonctionnel** avec les autres secteurs.

Ces vastes étendues boisées sont très intéressantes en terme de patrimoine naturel car elles sont anciennes.

28 781 ha
du territoire des Bertranges

48,39%
du territoire

Les milieux forestiers

Sont-ils menacés ?

Les principales menaces pesant sur la qualité de ce type d'habitat sont l'utilisation de **produits phytosanitaires**, **l'enrésinement** et **l'uniformisation** des boisements, **la gestion sylvicole** intensive et **la raréfaction des arbres très âgés**.

Il est important de maintenir une quiétude en forêt afin de ne pas déranger les espèces et notamment la Cigogne noire qui est nicheuse sur certaines communes du territoire.

Que faire ?

- **Maintenir la qualité de l'habitat** : augmenter les îlots de sénescence et les îlots de vieillissement, conserver du bois et des arbres morts ;
- **Maintenir des lisières** forestières diversifiées ;
- **Adapter les périodes d'intervention** de coupe et d'entretien pour éviter le dérangement voire la destruction d'espèces en période de reproduction ou d'hivernation ;
- **Respecter** les sols fragiles, les zones humides et les cours d'eau ;
- **Privilégier** des essences locales adaptées à une moindre disponibilité en eau et à une hausse des températures.



©D.Dupuy

Imprimé par : CIA Graphic - Conception : Originis

©D.Silvique

©E.Blaout



Le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*)

Crapaud de petite taille qui affectionne les ornières des chemins et les petites cuvettes créées par le piétinement des vaches. Dès qu'il se sent en danger, il peut exhiber son ventre jaune vif ponctué de noir comme signe de toxicité. Sur le territoire, il est connu en milieu forestier et dans le bocage.

Il possède une pupille en forme de cœur qui le distingue facilement des autres petits crapauds.



Le Grand capricorne (*Cerambyx cerdo*)

est un longicorne de couleur noire à brun-rougeâtre. L'espèce est liée aux chênes, châtaigniers et plus rarement à d'autres essences de feuillus. Elle affectionne les arbres relativement âgés dont le tronc est bien exposé au soleil.

Ce capricorne mène l'essentiel de sa vie au stade larvaire, il passe trois à cinq ans à se nourrir de bois, pour ensuite émerger au grand jour et vivre quelques mois seulement au stade adulte afin de se reproduire.



La Vesce de Cassubie (*Vicia cassubica*)

est une plante connue en Bourgogne uniquement dans la forêt domaniale des Bertranges. Elle est à rechercher dans les lisières le long des allées forestières sur des sols plus ou moins acides, secs et pauvres.

La Cassubie ou la Poméranie désignent des régions côtières de la Mer baltique qui sont situées en Pologne et en Allemagne où l'espèce est très présente.



L'Osmonde royale (*Osmunda regalis*)

est une fougère des boisements humides. C'est la plus robuste et la plus spectaculaire des fougères par ses grandes "feuilles" appelées frondes pouvant dépasser les 1,5 m.


Jusqu'aux années 1970 environ, ses racines étaient le principal élément de support dans la culture des orchidées tropicales. Cet usage a entraîné sa récolte massive dans les Landes par exemple.



La Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

est une espèce farouche, discrète et très sensible aux dérangements. Elle affectionne les Bertranges car la forêt lui permet d'installer son nid et elle trouve sa nourriture de prédilection (les chabots) dans les chevelus denses de petit cours d'eau de première catégorie et peu profonds.


Les balises posées dans la Nièvre par l'ACETAM et Nature Nièvre sur les adultes ont montré que pour mener à bien sa nichée, l'espèce a besoin d'un vaste territoire. Les jeunes doivent se débrouiller seuls pour trouver leur chemin pour migrer jusqu'en Afrique.



Classement des espèces menacées sur la liste rouge de Bourgogne selon le niveau de menace.

 **En danger**

 **Vulnérable**

 **Quasi menacée**